Максимальная концентрация пластинчатоклювых на озерах региона наблюдается в августе. По материалам авиаучетов, во второй половине августа 985–1988 гг. численность пластинчатоклювых и ысух на озерах долины р. Убаган и Наурзума колебалась от 160 тыс. до 1,3 миллиона (Виноградов, Ауэзов, 1995), из них на Наурзумских озерах от 40,2 тыс. в 1985 г. до 237,3 тыс. в 1987 г., в олине Убагана – от 109,6 тыс. до 1 116 тыс. На оз. Сарыкопа в эти же годы учитывали 33,7–76,6 тыс.птиц.

Пролет. Убаган-Ишимское междуречье и Тургайская ложбина давно известны как один из самых мощных в Евразии пролетных путей. Общая численность ежегодно пролетающих здесь водоплавающих и водно-болотных птиц оценивается миллионами, одних только гусей отмечается от 800000 до 1500000 особей.

Характер весенних и осенних миграций существенно различается. Общая продолжительность весеннего пролета, пик которого наблюдается в последней пятидневке апреля – первой пятидневке мая, составляет 45–60 дней. У большинства видов он носит транзитный характер и очень скоротечен, наиболее многочисленные группы мигрантов – кулики и пластинчатоклювые.

В Наурзуме среди первых, обычно уже в конце марта, появляются серебристые чайки, серые гуси и кряквы. Выраженный пролет пластинчатоклювых начинается 5–6 апреля и в основном заканчивается в начале мая. В первой половине апреля основную массу мигрантов составляют серый гусь, лебедь-кликун, шилохвость, кряква, чирок-свистунок, свиязь. С середины апреля появляются нырковые утки, лысухи и поганки, в третьей декаде пролетает большая часть белолобых гусей.

Пролет северных куликов проходит с 8–10 мая по начало июня. На озерах левобережья Ишима на весеннем пролете в 1985–1988 гг. доминировали нырковые и речные утки – 75,8% (39,9 и 35,9% соответственно), многочисленны гуси – 18,7%, пеганки и лебеди – 2,0 и 1,8% (Вилков, 1988).