



В степную зону области заходит северная окраинная часть гнездового ареала колпицы, поэтому гнездование ее носит нерегулярный характер. В Наурзумском заповеднике гнездится в полноводные годы группами или небольшими колониями. Самая крупная

– из 19 гнезд, была найдена в 1975 г. (Гордиенко и др., 1980). В 1983 – 1992 гг. колпицы гнездились на оз. Большой Аксуат и оз. Пресное, в 1985–1986 – на оз. Жангызколь, расположенном в 35 км к юго-западу от Наурзумского заповедника.

В 1987 г. вероятно гнездование на оз. Кушмурун, где эти птицы наблюдались в течение всего гнездового периода. С 1993 г. в районе Наурзума, видимо, не гнездились. В 1999–2001 гг. одиночные особи и группы колпиц отмечались на озерах Шолаккопа и Шошкалы (Убаган). На Сарыкопе гнездование колпиц более регулярно, по свидетельству рыбаков гнездовые колонии существовали до 1995 г.

Краснозобая казарка (*Branta ruficollis* Pall.).

По территории региона проходят традиционные пролетные маршруты краснозобой казарки. Однако, в 1970-х – начале 1980-х гг. этот вид почти полностью исчез, что, видимо, было связано с перемещением зимовок с Каспия на западное побережье Черного моря и смещением пролетных путей к западу – в долину Урала. Во второй половине

1980-х гг. краснозобые казарки вновь стали появляться во все возрастающем числе. Во второй половине 1990-х гг. в пик пролета, который приходится на период с 1 по 15 октября, доля краснозобых казарок среди гусей достигает 30%; по оценкам здесь пролетает до 100% всей популяции этого вида.