



До конца 1960-х гг. пискулька была обычным пролетным видом (Елкин, 1965), составляя значительную часть в добыче охотников. В отчете В.И.Азарова отмечалось, что в 1966 г. на оз. Жарколь (Наурзум) после 15 октября на одну стаю белолобых гусей приходилось 10 стай пискулек. Позднее численность этих гусей стала быстро сокращаться.

В учетах 1997–2000 гг. на озерах региона на долю пискульки приходилось всего 1–2% от числа всех гусей. В настоящее время они летят с белолобыми гусями отдельными выводками или небольшими группами, чистые стаи пискулек встречаются крайне редко. Наибольшее число отмечалось на озерах Кулыколь, Койбагар, Тюнтюгур, Бозшаколь. По оценкам финских специалистов, по этому миграционному пути пролетает 23–53% мировой популяции пискулек.

Малый лебедь (*Cignus bewickii* Yarrell).

В небольшом числе малый лебедь летит вместе с кликунами. Отмечались на озерах Большой Санкебай, Аксуат, Кулагуль, Тюнтюгур, Кулыколь. Обычно встречаются небольшими группами до 10–12 птиц, реже летят выводки.

Белоглазый нырок (*Aythya nyroca* Guld.).

В периоды обводнения в небольшом числе встречается на многих озерах северного Тургая, возможно на некоторых из них гнездится. На Наурзумских озерах в 1970–1980-х гг. гнездование не отмечалось, хотя в 1946 г. А.Н.Формозов нашел на Жарколе 6 гнезд (Формозов, 1981). В 1998–2000 гг. отмечался во время осеннего пролета на озерах Кулыколь, Большой Санкебай, Малый Аксуат, Шошкалы. На Кулыколе 2 пары

наблюдались 25.05.2001.