



Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus* Bruch.).

Летующие кудрявые пеликаны периодически отмечались на Наурзумских озерах с 1930-х гг., с 1967 г. они стали встречаться здесь регулярно, но гнездование впервые было отмечено лишь в 1981 г. (Гордиенко, 1986). Колония сначала располагалась на острове соленого оз. Жарман (система оз. Сарымоин), а в 1987 г. переместилась на оз. Жарколь, где пеликаны устраивали гнезда в тростниковых зарослях группами по 2–12 пар.

Кроме того, в 1983 г. колония из 16 гнезд была найдена на оз. Аксуат. Общая численность в 1981–1996 гг. колебалась от 16 до 42 пар. Многолетнее снижение уровня воды и исчезновение рыбы в 1997 г. сделали гнездование пеликанов невозможным, однако весной и осенью небольшие пролетные группы ежегодно останавливаются на оз. Жарколь, Малый Аксуат, Кулагуль. В 1998 г. была обнаружена колония кудрявых пеликанов у северных границ области на оз. Каракамыс – небольшом водоеме, связанном протокой с оз. Тениз (по свидетельству районного егеря, пеликаны гнездились на обоих озерах с 1997 г.).

В 2000 г. здесь гнездились 20 пар, еще 30–40 пар отмечены в колонии на оз. Шошкалы в 50 км южнее. Третья колония располагалась на оз. Кулыколь, где в 2000 г. насчитывалось 20 пар, в 2001 г. – 30–32 пары. На оз. Сарыкопа кудрявые пеликаны гнездились до середины 1990-х гг., в 1985–1988 гг. – 50–80 пар (Виноградов, Ауэзов, 1991). В 1997 г. С.Н. Ерохов наблюдал кудрявых пеликанов на оз. Новое Сливное, где, по словам рыбаков, пеликаны также гнездились.

Стаи бродячих птиц в 1985–1988 гг. отмечали на оз. Кушмурун, Шили, Шошкалы (Виноградов, Ауэзов, 1991), Сарыкопе. Во второй половине 1990-х гг. пеликаны обоих видов были обычны на водоемах поймы р. Убаган, особенно многочисленны на озерах системы Шошкалы. Стаи до 50–60 кудрявых пеликанов, в основном неполовозрелых, постоянно наблюдаются на оз. Тюнтюгур.